

殺虫剤

農林水産省登録
第22853号

フェニックス[®]

プロアブル

®は日本農業(株)の登録商標

新登場!!

プロアブルタイプ
誕生!



※写真はイメージです。



チャバマキ



チャノホソガによる被害



天敵に
やさしい

チビトビコバチ

チョウ目害虫に優れた効果! 効きめが長いから安心!!

殺虫剤

フェニクリス[®]

プロアブル

有効成分 フルベンジアミド…18.0%


毒 性 普通物



★新しいタイプの殺虫剤

新しいタイプの殺虫剤で、害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有します。

チャハマキ



無処理

筋肉収縮
摂食停止



フルベンジアミド
処理1日後

★チョウ目害虫に優れた効果

幅広いチョウ目害虫に高い効果を示します。幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示します。

★速やかな食害抑制効果

致死までにある程度の時間がかかりますが、速やかに摂食行動を阻害します。

★効果の持続性に優れる

散布後、長期間にわたって安定した効果を示します。

★抵抗性害虫にも有効

有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤、ベンゾイルフェニルウレア剤、BT剤等の薬剤に抵抗性の発達した害虫にも有効です。

★天敵・有用昆虫に安全性が高い

チョウ目昆虫にのみ選択的に活性を示します。それにより天敵を温存でき、ハダニやカイガラムシ等の天敵減少に起因する害虫の大量発生が起りにくい傾向が見られます。

ミツバチ・マルハナバチに対する影響も少ない薬剤です（カイコに対しては長期間影響があるので注意が必要です）。

【適用病害虫および使用方法】(抜粋)

(2010年12月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
茶	チャハマキ チャノホソガ	2000倍	200~400ℓ /10a	摘採 7日前まで	1回	散布	1回

(詳しくは製品ラベルをご確認ください)

上手な使い方

- 1 発蛾最盛期から約1週間後に散布することで、高い効果が期待できます。
- 2 浸透移行性がありませんので、かけむらのないように薬液を十分に散布してください。
開葉期や硬化期で安定した効果が期待できます。
- 3 ハマキムシ類などは、抵抗性が発達しやすいので、作用性の異なる他の薬剤とのローテーションで使用してください。

正しく安全にお使いいただくために

- 植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- 蚕に対しては長期間毒性があるので桑葉には、絶対にかかるないように散布してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 敷器器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は幼児の手の届く所に置かないでください。
● 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋1丁目2番5号
ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

2011年1月作成版(SPA) 0211055(1101)12M